

Inventaire des Hétérocères de la Forêt de Chizé Résultats préliminaires (2009-2011)



Ligne de capture : Forêt de Chizé (79)
Date : 28/09/2011
N° Ligne : 02605



Ligne de capture : Forêt de Chizé (79)
Date : 15/03/2012
N° Ligne : 02833

MAI 2012

SOMMAIRE

Remerciements	p. 3
Introduction	p. 4
Méthodologie	p. 5
I. Périodes	p.5
II. Techniques utilisées	p.6
III. Analyse des données	p.7
Résultats	p. 8
I. Résultats généraux	p. 8
II. Espèces particulières	p. 9
III. Premiers éléments de réflexion et perspectives	p. 11
Bibliographie	P. 12
Annexes	P. 13

Rédaction et inventaire : Antoine GUYONNET, bénévole Deux-Sèvres Nature Environnement

Coordination administrative et mise en page : Nicolas COTREL, directeur Deux-Sèvres Nature Environnement

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier Nicolas Cotrel et DSNE pour m'avoir confié l'étude, je remercie également Daniel Barré de l'ONF pour sa gentillesse et son accueil, ainsi que Jean-Pierre Favretto qui vérifie mes identifications. Merci également à Norbert Thibaudeau qui m'a transmis la Liste des observations 1937-1992 de Robert Levesque concernant la forêt de Chizé. Et pour finir, une nouvelle pensée pour Robert qui je le crois serait heureux de la poursuite de ses travaux.

A. Guyonnet

INTRODUCTION GENERALE

Depuis 2009, un inventaire des Lépidoptères Hétérocères de la RBI de la Forêt de Chizé a été mis en œuvre par Deux-Sèvres Nature Environnement, avec l'accord de l'ONF. L'objectif de cette étude est d'établir une liste des espèces présentes ainsi que de comparer avec le précédent inventaire (1995-2002), le compléter sur certains tribus (microlépidoptères..) non inventoriés alors ainsi que d'effectuer une comparaison entre les peuplements entre la partie en et hors RBI.

Il n'existe que peu d'étude sur ce sous-ordre à l'échelle régionale, dont la liste des espèces présentes est encore à définir, et encore moins de suivi sur une aussi longue durée. DSNE, membre jusqu'en 2007 du comité directeur de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage et actuellement de celui de la RBI, contribue ainsi à continuer à participer à l'amélioration de la connaissance de la biodiversité de ce site : Coléoptères (Drouhet P., 1995-97), Lépidoptères (Levesque R., 1995-2002), Mollusques (Buissonnet S., 1995-98, rapport 1999), Micromycètes (Fourré G, 1995), Lépidoptères Rhopalocères (inventaire Natura 2000 et atlas régional – Cotrel N. (coord), depuis 2009), habitats des milieux ouverts (inventaire Natura 2000 – Le Fouler A., 2009).

L'ensemble de ces inventaires a été réalisé par un de ses bénévoles, Antoine Guyonnet. Ce rapport est un bilan intermédiaire de ce travail, pour les trois premières années de l'inventaire.

N. Cotrel

INTRODUCTION SPECIFIQUE

Etude des Lépidoptères hétérocères de la RBI de Chizé, trois ans déjà ...

Cela fait donc trois ans que Deux-Sèvres Nature Environnement, avec l'accord d'accès de l'ONF, m'a confié le privilège de faire l'inventaire des papillons nocturnes de la RBI de Chizé. Je parle bien d'un privilège car prendre la suite de Robert Levesque sur ces lieux est pour moi très important. J'ai bien sur une immense pensée pour Robert qui nous a quittés fin 2011 et pour lequel j'avais une grande admiration et un profond respect. Je garderai toujours en souvenir les soirées de chasses aux papillons passées en de nombreuses forêts de la région et qui m'amènera même à le suivre jusqu'en Guyane ou il m'a entraîné. Sans Robert, mon intérêt pour les lépidoptères ne se serait sûrement pas transformé en passion. J'espère que je serai à la hauteur pour continuer son travail sur la forêt de Chizé. Privilège également de pénétrer dans la réserve où tout est beau et sent merveilleusement bon, la nature retrouvée pour des soirées inoubliables.

La RBI (créée par l'ONF) est essentiellement composée de feuillus avec une belle présence du hêtre, ce qui en fait un endroit particulièrement intéressant à suivre, le réchauffement climatique menaçant gravement cette essence. L'altitude de la RBI varie de 40 à 100 mètres. Elle occupe les plans d'un ancien dépôt de munition installé durant la seconde guerre mondiale, dépôt ensuite utilisé par les alliés. Les emplacements de ces dépôts sont toujours visibles et sont des lieux privilégiés pour installer le matériel de chasse de nuit.

A. Guyonnet

METHODOLOGIE

I. Périodes

Au cours des trois années écoulées (2009 – 2010 – 2011), six sites de chasses nocturnes (tab. 1, fig.1) ont été utilisés pour un total de 17 sorties. Ces sorties ont été réalisées sur les mois de mars à octobre, préférentiellement les soirs de pleine lune. Les mois d'hiver n'ont pas encore été prospectés faute de conditions favorables ou de disponibilités. En hiver, un passage le soir est nécessaire pour déposer des pièges lumineux et un second passage doit suivre le lendemain matin pour relever les pièges. Les espèces d'hiver ne sont donc pour l'instant que peu ou pas présentes dans la liste de celles relevées au cours de ces trois années.

Pour établir la liste la plus complète possible et montrer l'importante diversité en matière de lépidoptères de la RBI, je suis parti de la liste établie entre 1937 et 1992 par Robert Levesque.

Tab. 1 : Coordonnées des sites de chasses nocturnes

Lieux-dits	Communes	Coordonnées géographiques		Dates d'inventaire
Carrefour de Paitout	VILLIERS-EN-BOIS	61	30TYS0012	30T 0700569 22/06/2009 UTM 5112257 ou 11/09/2009 30T 0700205 01/07/2010 UTM 5112103 28/10/2011
carrefour du Chêne Péré	VILLIERS-EN-BOIS	86	30TXS9707	(30T 0697952 25/09/09 UTM 5107982)
Les Sept Chênes	VILLIERS-EN-BOIS	86	30TYS0212	(30T 0702778 05/07/09 UTM 5112153)
route forestière n°4, Virollet		94	30TYS0212	(30T 0702393 15/03/2009 UTM 5112989) 21/03/2009 31/05/2009 14/06/2009 05/07/2009 18/03/2010 21/05/2010 11/03/2011 02/06/2011
carrefour du Pas du Loup	BELLEVILLE	73	30TXS9711	(30T 0697830 21/08/10 UTM 5111682)
carrefour du Raclis	BELLEVILLE	104	30T0698187	UTM 5109058 25/03/11

Localisation des inventaires Hétérocères en Forêt de Chizé




Fig. 1 : carte de localisation des sites d'étude


II. Techniques employées

Quatre techniques ont été employées :

- drap lumineux : *Le drap est installé sur une structure en tuyaux PVC. Ceci permet de le tendre et d'avoir une surface plane même si le vent se lève un peu. La taille du drap est d'environ 2 m X 2 m. L'ampoule utilisée est un ballon à vapeur de mercure (50 à 80 watts). L'ampoule est placée à environ 2m du sol. Le sol est recouvert sous et autour du drap d'autres draps posés au sol afin de mieux distinguer les papillons qui approchent. L'alimentation en électricité est faite par un petit groupe électrogène.*
- pièges lumineux : *Il s'agit de boîtes contenant des alvéoles afin que les papillons s'y posent. Ces boîtes sont percées sur le dessus pour y mettre un entonnoir qui est lui même surmonté d'un tube UV d'une puissance de 15 watts. Le piège est posé sur un drap. Une autre sorte de piège, sorte de cage au milieu de laquelle est placé un tube UV est également utilisé occasionnellement.*
- miellées (sur troncs) : *La composition des miellées est variable suivant la saison, mais il s'agit d'une sorte de compote de fruits avec un ajout d'alcool. Cette substance est déposée sur les arbres à l'aide d'un pinceau afin d'attirer des espèces qui ne viennent pas à la lumière.*
- battage, en soirée, des branches à proximité du drap et des pièges à l'aide d'un parapluie japonais



Drap lumineux (A. Guyonnet)



Deux modèles de pièges lumineux (A. Guyonnet)

Les espèces non identifiées sur site sont prélevées afin de les identifier ultérieurement. Pour cela, une identification préalable est réalisée afin de s'assurer que l'espèce en question ne soit pas une espèce protégée.

III. Analyse des données

Les résultats seront présentés afin de décrire les conditions d'observation :

- pression d'observation (dates d'observation)
- cartographie des zones d'observation avec distinguo des techniques
- liste des espèces observées par site/milieu, date de capture et statut éventuel (tableau type ci-dessous)

Famille	Espèce (nom latin, descripteur)	statut	Site 1	Site 2	...
		Protection, liste rouge ou déterminance régionale	date	date	...

Pour l'analyse, qui aura lieu après plusieurs d'années (rythme à définir en fonction de la pression d'observation qui aura pu être exercée), seront détaillés :

- comparaison de la diversité spécifique dans et hors RBI
- comparaison de la diversité spécifique par site et par milieu
- comparaison chronologique entre la liste d'espèces établie par R Levesque et les observations effectuées : nouvelles espèces, espèces non retrouvées à mettre en lien avec la pression d'observation et les différences de milieu

Ces résultats seront valorisés sous 4 formes :

- 1 compte-rendu pour l'ONF (ici, un rapport intermédiaire)
- 1 article naturaliste (type revue naturaliste "nature entre deux Sèvre" – DSNE),
- mise en ligne des résultats sur le site d'A. Guyonnet (<http://www.papillon-poitou-charentes.org>),
- valorisation éventuelle à des fins pédagogiques pour le Zoodysée

RESULTATS

I. Résultats généraux

Un nombre important d'espèces n'a pas encore été retrouvé par rapport à la liste de Robert, soit environ 45%. Cependant, je pense que ce manque est plus dû à une pression d'observation qui n'est pas encore très grande (seulement 3 ans) alors que Robert a prospecté les lieux pendant une soixantaine d'années. Nombre d'espèces non encore retrouvées sont des espèces communes qui faute d'une sortie à la bonne date n'ont pas encore été observées.

Avoir déjà retrouvé 55 % de la liste de Robert en trois ans est déjà une belle satisfaction, d'autant que durant ces trois premières années d'études sur la RBI, ce ne sont pas moins de 171 espèces qui ont été ajoutées à la liste de Robert (cette liste comprenait à l'origine 499 espèces dont j'ai retiré 18 taxons jugés douteux, voir la liste), portant le **total temporaire à 652 espèces** (annexe 1) :

- 481 espèces de la liste Levesque (dont 264 retrouvées soit 55%).
- 171 nouvelles espèces trouvées (dont plusieurs sont nouvelles pour les Deux-Sèvres).

Concernant les nouvelles espèces, il s'agit pour la plupart de microlépidoptères mais également plusieurs macro-hétérocères. Une vérification est en cours, avec les listes départementales et le site national Lepinet, afin de vérifier si il s'agit bien de nouveautés pour les Deux-Sèvres.

Le grand nombre d'espèces nouvelles pour la liste s'explique en partie par la prise en compte des microlépidoptères, car Robert Levesque ne les capturait pas. Néanmoins un nombre non négligeable de nouvelles espèces de macro-hétérocères a été trouvé.

Ceci montre bien, s'il en est encore besoin, la grande importance de la RBI qui est clairement un point chaud de biodiversité.

II. Espèces particulières

Des espèces patrimoniales comme l'Endromis (*Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) que Robert Levesque indiquait comme espèce à protéger dans la région et non retrouvée depuis plus de vingt ans à Chizé ainsi que la rare et protégée Laineuse du prunellier (*Eriogaster catax* (Linnaeus, 1758), ont d'ores et déjà été observées, à ma plus grande joie (fiches descriptives en annexe 2).



Endromis



Laineuse du prunellier

Quelques exemples de macro-hétérocères (les chiffres avant le nom de l'espèce correspondent à la classification Leraut) nouveaux pour le département (source : Delachaux et niestlé, Guide des papillons nocturnes de France, coordonné par Roland Robineau) :

3691 - *Xanthorhoe biriviata* (Borkhausen, 1794) :

Cette espèce possède deux générations dont les formes vernale et estivale (forme sombre) sont bien différentes.

Répartie à travers l'Europe centrale et septentrionale jusqu'au Japon. En France, elle est localisée dans les massifs forestiers des Vosges, du Massif Central, du Jura, de la Chartreuse, des Alpes, des Pyrénées. Se rencontre aussi par place dans les plaines septentrionales (Oise, Aisne). Elle affectionne les sous-bois sombres, près des ruisseaux, aux bords desquels se localisent ses plantes hôtes : *Impatiens noli-tangere*, *I. capensis*, *I. parviflora*.

Le papillon vient à la lumière, mais s'observe souvent voletant de jour et au crépuscule.

Période de vol : V-VI ; VII-VII. - Espèce bivoltine

3753 - *Thera variata* (Denis & Schiffermüller, 1775) :

Proche de *Thera obeliscata* mais d'un ton assez bigarré, lignes transversales bien festonnées.

Elle est largement répartie en Europe jusqu'en Asie et au Japon, mais est absente des îles Britanniques. En France, elle est présente un peu partout dans les bois de résineux, en plaine comme en montagne. La chenille se nourrit sur *Abies alba*.

La chenille hiverne.

Période de vol : V-VI; VII-IX. - Espèce bivoltine

3819 - *Eupithecia haworthiata* (Doubleday, 1856) :

Reconnaissable à sa petite taille, ses ailes arrondies et à la teinte rosée qui apparaît sur le haut de l'abdomen.

Répartie dans toute l'Europe, de l'Espagne au Caucase, puis en Asie centrale jusqu'en Chine. Dans presque toute la France.

Thermophile, elle occupe divers milieux : jardins à l'abandon, friches, bords de chemins. Vol crépusculaire. Vient facilement à la lumière. Les chenilles se nourrissent des parties florales de *Clematis vitalba*, à l'intérieur de la capsule renfermant les bourgeons. Hiverne et chrysalide, comme presque toutes les Eupithecia.

Période de vol : V-VIII - Espèce univoltine mais présentant une seconde génération partielle.

3892 - *Eupithecia dodoneata* (Guenée, 1857) :

Variable, elle est proche d'*Eupithecia abbreviata*, mais plus petite, avec un point discal souvent rond.

Présente dans toute l'Europe moyenne et méditerranéenne. En France, deux populations se partagent le territoire : celle du Sud, qui est plus petite, aux dessins plus contrastés, adaptée à la chênaie méditerranéenne (*spp austriana*, Herbulot) et plus au nord, une population adaptée à la chênaie tempérée. La sous-espèce *austriana* est plus commune.

Elle vole en compagnie de *E. abbreviata*, avec laquelle elle partage les mêmes habitats, mais de manière bien moins abondante. Préfère les endroits chauds, les bords des forêts abritées, le maquis. Chenille sur chênes (*Quercus spp*).

Période de vol : V-VI dans le Nord, IV-VI ; (IX) - Espèce univoltine dans le nord ou bivoltine dans le Sud, avec parfois une troisième génération dans l'extrême Sud.

3945 - *Trichopteryx polycommata* (Denis & Schiffermüller, 1775) :

A l'habitus variable, la femelle est plus contrastée.

Largement distribuée en Europe, puis en Asie jusqu'au Japon. En France, elle est surtout présente dans l'est et le centre, ponctuellement ailleurs. Souvent localisée et observée par individus isolés, elle fréquente aussi bien les coteaux secs, thermophiles et broussailleux, que les boisements frais jusqu'à 1300 m d'altitude. Vol crépusculaire autour de ses plantes hôtes. Le papillon est faiblement attiré par la lumière.

La chenille vit sur *Ligustrum vulgare*, *Lonicera periclymenum*, *L. xylosteum*, *Fraxinus excelsior*. Elle se développe à ses débuts dans les bourgeons. La chrysalide hiverne.

Période de vol : III-V - Espèce univoltine.

Contrairement à ce qui est indiqué dans le Guide Robineau, j'ai constaté que cette espèce venait facilement à la lumière en Forêt de Chizé et pas forcément quelques individus isolés mais certains soirs en nombre (Guyonnet Antoine).

4219 - *Eilema depressa* (Esper, 1787) :

Eurasiatique. En France, partout, mais localisée, présente en Corse.

Elle affectionne aussi bien les forêts mixtes, de feuillus ou de résineux mais est plus fréquente en plaine. La chenille se trouve sur divers lichens.

Période de vol : V-IX - Espèce univoltine ou bivoltine selon l'altitude

4284 - *Schrankia taenialis* (Hübner, 1809) :

Méditerranéo-asiatique. Elle occupe une partie de l'Europe septentrionale, excepté l'extrême Nord, et l'Europe centrale. En France, elle est présente dans le quart nord-est, depuis la région parisienne jusqu'au Jura.

De par sa petite taille, elle peut être confondue avec un microlépidoptère et passe très souvent inaperçue.

C'est une espèce hygrophile que l'on rencontre au bord des ruisseaux, dans les zones marécageuses ... La chenille consomme entre autres *Calluna vulgaris*.

Période de vol : VII-IX. Espèce univoltine à bivoltine.

4385 - *Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775) :

Répandue dans toute l'Europe moyenne, du sud de la Scandinavie jusqu'aux Pyrénées et, à l'est, jusqu'au Caucase, aux Balkans et à l'Asie Mineure. Présente partout en France, Corse comprise. Fréquente les forêts claires, les chênaies. La chenille, polyphage, se nourrit sur divers arbres et arbustes, principalement les Chêne, Hêtre, Tilleul, Prunier (*Quercus*, *Fagus*, *Tilia*, *Prunus*) dont elle consomme les feuilles et les Lichens poussant sur les écorces.

Période de vol : IV-VI ; VII-VIII dans les régions méridionales. Espèce univoltine ou bivoltine selon la latitude.

4555a - *Aporophyla lueneburgensis* (Freyer, 1848) :

Européenne. Largement répandue en Europe, de la Scandinavie à la France, en passant par l'Europe centrale.

Les relations spécifiques avec *A. lutulenta* ne paraissent pas claires, mais il semble qu'elles s'excluent et qu'il n'existe en France que cette espèce, *A. lutulenta* étant, quant à elle, présente dans le sud de l'Europe et une partie de l'Europe centrale.

Thermophile, elle affectionne les milieux ouverts prairiaux. La chenille se nourrit sur Genêts, Stellaires, Myosotis (*Genista*, *Stellaria*, *Myosotis*), ainsi que d'autres plantes basses.

Période de vol VIII-XI. Espèce univoltine.

4493 - *Conistra staudingeri* (Graslin, 1863) :

Atlanto-méditerranéenne. En Europe, répartition restreinte à la péninsule Ibérique, la France, la Suisse et l'Italie. En France, dans le midi, présente sur une large bordure méditerranéenne. Elle occupe les milieux forestiers jusqu'à 1600 m d'altitude. De coloration variable, l'adulte n'est pas toujours aisément identifiable.

La chenille est polyphage.

Période de vol : X-V. Espèce univoltine, l'adulte hiverne et vole de nouveau au printemps.

4916 - *Noctua janthe* (Borkhausen, 1792) :

Atlanto-méditerranéenne. Occupe la moitié ouest de l'Europe, de la péninsule Ibérique au sud de la Scandinavie, la Pologne, l'ouest de la Roumanie et l'Italie. Confondue avec le taxon *janthina* jusqu'en 1991, sa répartition semble assez large en France, mais elle souffre des imprécisions liées à la difficulté de distinguer ces espèces jumelles. Le statut taxonomique de ces deux entités est d'ailleurs encore sujet à discussion. Les différences entre *N. janthe* et *N. janthina* se situent sur l'aile postérieure et au revers de l'antérieure. Chez *N. janthe*, la bordure noire et épaisse des postérieures forme un croissant (chez *N. janthina*, elle se prolonge en partie haute jusqu'au niveau de la base thoracique). Au revers des antérieures, le bord extérieur de la tache noire est digité, aux limites nettes (tache plus large, au bord droit et aux limites diffuses chez *N. janthina*). Peu exigeante, mais paraissant plus thermophile que *N. janthina*, elle vole dans divers milieux ouverts, y compris en ville.

La chenille, polyphage, consomme des plantes basses.

Période de vol : Juin à Octobre. Espèce univoltine, à diapause estivale.

Certaines de ces espèces sont déjà mentionnées pour le 79 par le site Lepinet, les informations lui ayant été transmises.

III. Premiers éléments de réflexion et perspectives

Les années à venir vont sans aucun doute apporter leurs lots de nouveautés et d'espèces retrouvées. Au moment où la nature sauvage recule partout, il est important de préserver des lieux comme la RBI de Chizé, lieux qui sont à respecter comme des sanctuaires de vie, en espérant que l'avenir ne les isolera pas au milieu d'un désert vide de diversité. J'espère que l'ONF et DSNE poursuivront leur partenariat afin de continuer l'étude des lépidoptères hétérocères de cette forêt qui n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets.

Principales références bibliographiques

Drouet E., Favretto J-P, 2010. Point d'avancement du Catalogue des Lépidoptères hétérocères de l'Ouest Ligérien au 01/01/2010.

Gelin H. et Lucas M., 1922. Catalogue des Lépidoptères de l'Ouest Atlantique – 1912 – 1922. Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres

Levesque R., 1984. Complément 1983 au Catalogue des Lépidoptères de l'Ouest Atlantique – 1912 – 1922 (Gelin et Lucas). Deux-Sèvres Nature Environnement.

ONCFS, ONF, 2003. Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Chizé : programme de gestion (1994-2003). 40p

ONCFS, ONF. Rapports annuels d'activités remis lors des comités directeurs : 4 juillet 2003 (saison 2002-03), 4 juillet 2002 (saison 2001-02), 12 juillet 1994 (saison)

Robineau R., 2007 Guide des papillons nocturnes de France. Delanchoix et Niestlé. 287p.

Sites internet :

www.lepinet.fr,

www.papillons-poitou-charentes.fr

www.6pattes.fr

Annexe 1 : Liste des Lépidoptères hétérocères observés sur la RBI de Chizé depuis 1937 (par ordre taxonomique)

La première colonne indique le numéro dans la liste Leraut de 1997.

La deuxième colonne indique le genre et l'espèce correspondant au numéro Leraut de la première colonne.

La troisième colonne a pour mention « Liste Levesque » si l'espèce se trouvait dans l'inventaire de Robert, les espèces nouvellement mentionnées n'ont pas de mention.

La quatrième colonne a pour mention « Non retrouvé à ce jour » si l'espèce est présente dans la Liste Levesque mais n'a pas encore été retrouvée au cours des trois premières années d'étude, les espèces retrouvées n'ont pas de mention.

La cinquième colonne a pour mention « Douteux » quand j'ai estimé l'espèce peu probable en forêt de Chizé alors qu'elle était dans la Liste Levesque.

Liste peu lisible en l'état je trouve, surtout pour repérer les colonnes

MICROPTERIGIDAE

1 ;Micropterix tunbergella (Fabricius, 1784) ; ; ;

HEPIALIDAE

170 ;Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) ;Liste Levesque; ;

173 ;Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;

ADELIDAE

189 ;Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) ; ; ;

TINEIDAE

406 ;Tinea trinotella (Thunberg, 1794) ; ; ;

YPONOMEUTIDAE

617 ;Ypsolopha sequella (Clerck, 1759) ; ; ;

626 ;Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) ; ; ;

691 ;Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) ; ; ;

692 ;Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) ; ; ;

693 ;Yponomeuta malinellus (Zeller, 1838) ; ; ;

696 ;Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796) ; ; ;

697 ;Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;

COLEOPHORIDAE

787 ;Coleophora trifolii (Curtis, 1832) ; ; ;

ELACHISTIDAE

1120;Ethmia quadrilella (Goeze, 1783) ; ; ;

1122;Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758) ; ; ;

1180;Agonopterix liturosa (Bradley, 1966) ; ; ;

1206;Agonopterix pallorella (Zeller, 1839) ; ; ;

1207;Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;

1214;Agonopterix rotundella (Douglas, 1846) ; ; ;

CARCINIDAE

1223;Carcina quercana (Fabricius, 1775) ; ; ;

CHIMABACHIDAE

1224;Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;

OECOPHORIDAE

1234;Pleurota aristella (Linnaeus, 1767) ; ; ;

1249;Harpella forficella (Scopoli, 1763) ; ; ;

1254;Batia unitella (Hübner, 1796) ; ; ;

COSMOPTERIGIDAE

1421;Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847) ; ; ;

GELECHIIDAE

1763;Syncopacma cinctella (Clerck, 1759) ; ; ;

1798;Dichomeris derasella (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;

COSSIDAE

1817;Cossus cossus (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;

1820;Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour; ;

1823;Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) ;Liste Levesque; ;

ZYGAENIDAE

1882;Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour; ;

1886;Jordanita globulariae (Hübner, 1793) ;Liste Levesque; ;

1891;Adscita statices (Linnaeus, 1758)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
1892;Aglaope infausta (Linnaeus, 1767)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
1896;Zygaena sarpedon (Hübner, 1790)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
1899;Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
1903;Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
1905;Zygaena rhadamanthus (Esper, [1793])				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour ;Douteux;
1915;Zygaena transalpina (Esper, 1780)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
1916;Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
1917;Zygaena trifolii (Esper, 1783)				;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;

LIMACODIDAE

1919;Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)				;Liste Levesque;	
---------------------------------------	--	--	--	------------------	--

TORTRICIDAE

1937;Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
1944;Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764)				;		
1946;Archips podana (Scopoli, 1763)				;		
1949;Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)				;		
1950;Archips rosana (Linnaeus, 1758)				;		
1951;Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)				;		
1952;Syndemis musculana (Hübner, [1799])				;		
1985;Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)				;		
1997;Doloploca punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2048;Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)				;		
2075;Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)				;		
2077;Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)				;		
2098;Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2122;Diceratura ostrinana (Guenée, 1845)				;		
2129;Cochylis hybridella (Hübner, 1813)				;		
2136;Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)				;		
2139;Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)				;		
2140;Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)				;		
2141;Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)				;		
2142;Acleris forsskaeleana (Linnaeus, 1758)				;		
2146;Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2155;Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2164;Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2190;Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2239;Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)				;		
2242;Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828)				;		
2249;Epiblema cynosbatella (Linnaeus, 1758)				;		
2250;Epiblema uddmanniana (Linnaeus, 1758)				;		
2254;Epiblema roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2266;Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2286;Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2310;Eucosma conterminana (Guenée, 1845)				;		
2321;Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2389;Cydia triangulella (Goeze, 1783)				;		
2390;Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)				;		
2400;Cydia amplana (Hübner, 1800)				;		
2402;Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)				;		
2475;Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2481;Hedya pruniana (Hübner, 1883)				;		
2482;Hedya nubiferana (Haworth, 1811)				;		
2503;Argyroploce lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2514;Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)				;		
2522;Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2527;Celypha cespitana (Hübner, 1817)				;		
2547;Endothenia marginana (Haworth, 1811)				;		

PTEROPHORIDAE

2623;Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)				;		
2625;Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2676;Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)				;		
2704;Adaina microdactyla (Hübner, 1813)				;		
2724;Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)				;		

PYRALIDAE

2730;Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)				;		
2732;Actenia brunnealis (Treitschke, 1829)				;		
2734;Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)				;		
2751;Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)				;		
2831;Nephoterix angustella (Hübner, 1796)				;		
2832;Conobathra tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2844;Trachycera advenella (Zincken, 1818)				;		
2846;Trachycera legatea (Haworth, 1811)				;		
2901;Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)				;		
2904;Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		

CRAMBIDAE

2950;Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)				;		
2958;Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)				;		
2960;Crambus perlella (Scopoli, 1763)				;		
2964;Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2966;Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2971;Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)				;		
2975;Agriphila geniculea (Haworth, 1811)				;		
2988;Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)				;		

2995;Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;	;
3007;Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)	;	;	;
3019;Ancylolema tentaculella (Hübner, 1796)	;	;	;
3031;Scoparia basistrigalis (Knaggs, 1866)	;	;	;
3033;Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)	;	;	;
3035;Scoparia conicella (La Harpe, 1863)	;	;	;
3036;Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;	;
3041;Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)	;	;	;
3049;Eudonia delunella (Stainton, 1849)	;	;	;
3055;Witlesia pallida (Curtis, 1827)	;	;	;
3059;Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;	;
3061;Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)	;	;	;
3070;Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)	;	;	;
3091;Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)	;	;	;
3097;Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)	;	;	;
3128;Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)	;	;	;
3129;Eurrhyncha hortulata (Linnaeus, 1758)	;	;	;
3138;Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;	;
3143;Nascia ciliaris (Hübner, 1796)	;	;	;
3144;Udea ferrugalis (Hübner, 1796)	;	;	;
3171;Mecyna asinalis (Hübner, 1819)	;	;	;
3172;Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;	;
3175;Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;	;
3191;Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)	;	;	;

LASIOCAMPIDAE

3201;Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3203;Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3205;Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3207;Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3208;Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3209;Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3213;Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3214;Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3215;Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3217;Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3218;Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3220;Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3226;Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;

SATURNIIDAE

3229;Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3230;Aglia tau (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3232;Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3233;Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;

SPHINGIDAE

3238;Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3239;Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3240;Laothoe populi (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3242;Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3243;Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3244;Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3245;Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3246;Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3247;Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3249;Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3258;Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3259;Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;

DREPANIDAE

3516;Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3517;Thyatira batis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3518;Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3519;Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3521;Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3523;Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3524;Polyploca ridens (Fabricius, 1787)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3526;Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3527;Drepana falcata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3529;Cilix glaucata (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;	;
3529;Cilix glaucata (Scopoli, 1763)	;	;
3530;Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3531;Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3533;Sabra harpagula (Esper, 1786)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;

GEOMETRIDAE

3536;Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
3537;Alsophila aceraria (Denis & schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3538;Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3539;Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3542;Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3543;Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
3544;Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3545;Thetidia plusiaria (Boisduval, 1840)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;	;
3546;Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)	;Liste Levesque;	;
3547;Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3552;Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;	;

3553;Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3556;Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)	;Liste Levesque;	;
3558;Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3559;Cyclophora lennigiaria (Fuchs, 1883)	;Liste Levesque;	;
3560;Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)	;Liste Levesque;	;
3564;Cyclophora ruficilaria (Herrich-Schäffer, 1855)	;Liste Levesque;	;
3565;Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3566;Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)	;Liste Levesque;	;
3567;Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3569;Cyclophora linearia (Hübner, [1799])	;Liste Levesque;	;
3570;Timandra comae (Schmidt, 1931)	;Liste Levesque;	;
3573;Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)	;Liste Levesque;	;
3576;Scopula umbelaria (Hübner, [1813])	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3577;Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3579;Scopula ornata (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3582;Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3585;Scopula marginepunctata (Oberthür, 1917)	;Liste Levesque;	;
3588;Scopula imitaria (Hübner, 1799)	;Liste Levesque;	;
3589;Scopula immutata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3591;Scopula floslactata (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;	;
3604;Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1846)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3605;Idaea ochrata (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;	;
3611;Idaea vulpinaria (Herrich-Schäffer, 1851)	;Liste Levesque;	;
3613;Idaea laevigata (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3620;Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3622;Idaea sylvestraria (Hübner, [1799])	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3629;Idaea biselata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3632;Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)	;	;
3633;Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3634;Idaea politaria (Hübner, [1799])	;	;
3638;Idaea seriata (Schrank, 1802)	;	;
3641;Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3645;Idaea subsericeata (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;	;
3649;Idaea trigeminata (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;	;
3655;Idaea ostrinaria (Hübner, 1813)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	Douteux;
3657;Idaea aversata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3658;Idaea bilinearia (Fuchs, 1878)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3659;Idaea degeneraria (Hübner, 1799)	;Liste Levesque;	;
3660;Idaea straminata (Borkhausen, 1794)	;	;
3661;Idaea maritimaria (Bruand, 1846)	;Liste Levesque;	;
3666;Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)	;Liste Levesque;	;
3667;Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3668;Rhodometra sacraia (Linnaeus, 1767)	;Liste Levesque;	;
3671;Lythria purpuraria (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;	;
3685;Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3687;Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3690;Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3692;Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3695;Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)	;Liste Levesque;	;
3698;Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3703;Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
3708;Epirrhoe alternata (Müller, 1764)	;Liste Levesque;	;
3709;Epirrhoe rivata (Hübner, [1813])	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3711;Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
3715;Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3726;Anticlea badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
3727;Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3728;Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3730;Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
3732;Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3733;Nebula salicata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3738;Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
3740;Eulithis populata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3742;Eulithis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;
3745;Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3747;Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	Douteux;
3748;Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3749;Cidaria fulvata (Forster, 1771)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3752;Thera obeliscata (Hübner, 1787)	;	;
3753;Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3757;Thera juniperata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3758;Thera cupressata (Geyer, 1831)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3760;Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3765;Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;	;
3769;Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)	;Liste Levesque;	;
3771;Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3778;Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	Douteux;
3779;Spargania luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	Douteux;
3787;Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;
3788;Philereme transversata (Hufnagel, 1767)	;Liste Levesque;	;
3789;Euphyia biangulata (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3790;Euphyia unangulata (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3793;Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3795;Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)	;Liste Levesque;	;
3796;Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3801;Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
3806;Perizoma minorata (Treitschke, 1828)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	Douteux;
3808;Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;

3819;Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856) ; ; ;
3824;Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3829;Eupithecia irriguata (Hübner, 1813) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
3830;Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
3840;Eupithecia venosata (Fabricius, 1787) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3846;Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3849;Eupithecia breviculata (Donzel, 1837) ;Liste Levesque;
3891a;Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831) ;Liste Levesque;
3892;Eupithecia dodoneata (Guenée, 1858) ; ; ;
3906;Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) ;Liste Levesque;
3907;Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) ;Liste Levesque;
3909;Chloroclystis rectangulata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
3912;Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
3913;Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
3915;Horisme tersata ou H. radicularia ; ; ;
3916;Horisme aemulata (Hübner, [1813]) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
3919;Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3927;Aplocera efformata (Guenée, 1857) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3929;Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3938;Asthenia albulata (Hufnagel, 1767) ; ; ;
3941;Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) ; ; ;
3943;Minoa murinata (Scopoli, 1763) ;Liste Levesque;
3944;Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3945;Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;
3946;Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3950;Acasis viretata (Hübner, [1799]) ; ; ;
3952;Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3955;Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
3956;Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
3958;Stegania trimaculata (Villers, 1789) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3960;Macaria notata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3961;Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3963;Macaria liturata (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3965;Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3969;Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
3974;Tephрина murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3982;Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3987;Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
3988;Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) ;Liste Levesque;
3989;Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799) ;Liste Levesque;
3992;Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
3997;Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
3999;Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4000;Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4001;Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4002;Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) ;Liste Levesque;
4005;Selenia dentaria (Fabricius, 1775) ; ; ;
4006;Selenia lunularia (Hübner, 1788) ;Liste Levesque;
4007;Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) ;Liste Levesque;
4009;Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4010;Crocallis elinguarina (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
4012;Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4013;Colotois pennaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
4014;Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
4015;Biston strataria (Hufnagel, 1767) ;Liste Levesque;
4016;Biston betularia (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
4017;Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
4018;Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
4019;Erannis defoliaria (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4020;Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4021;Larerrannis aurantiaria (Hübner, [1799]) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4022;Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) ; ; ;
4022;Larerrannis marginaria (Fabricius, 1777) ;Liste Levesque;
4023;Cryopega aerugaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4024;Lycia hirtaria (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4032;Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) ;Liste Levesque;
4043;Synopsisia sociaria (Hübner, 1799) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4047;Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
4050;Peribatodes perversaria (Boisduval, 1840) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4058;Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4060;Alcis repandata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4064;Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
4065;Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) ;Liste Levesque;
4067;Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767) ;Liste Levesque;
4068;Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4069;Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
4070;Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;
4071;Paradarisa consonaria (Hübner, 1799) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4074;Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4077;Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4080;Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4081;Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;
4082;Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) ;Liste Levesque;
4083;Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) ; ; ;
4084;Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;
4085;Lomographa distinctata (Herrich-Schäffer, 1839) ; ; ;
4086;Theria rupicaprararia (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4087;Theria primaria (Haworth, 1809) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;

4088;Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) ;Liste Levesque; ;
4089;Campaea honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4093;Pungelera capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4095;Gnophos furvatus (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4104;Rhopalognophos glaucinaria (Hübner, 1799) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
4106;Charissa variegatus (Duponchel, 1830) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4108;Euchrognophos mucidaria (Hübner, 1799) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4124;Siona lineata (Scopoli, 1763) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4126;Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4127;Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4128;Dyscia penulataria (Hübner, 1819) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
4133;Perconia strigillaria (Hübner, 1787) ;Liste Levesque; ;

NOTODONTIDAE

4138;Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4139;Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4141;Clostera curtula (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4144;Clostera pigra (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4145;Gluphisia crenata (Esper, 1785) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4146;Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4148;Peridea anceps (Goeze, 1781) ;Liste Levesque; ;
4149;Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4150;Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque; ;
4151;Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4153;Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque; ;
4154;Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4155;Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) ; ; ;
4156;Notodonta torva (Hübner, 1803) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
4157;Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4159;Pheosia tremula (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4160;Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4163;Pterostoma palpina (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4164;Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4165;Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4167;Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4168;Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) ;Liste Levesque; ;
4169;Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4172;Furcula furcula (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4173;Furcula bifida (Brahm, 1787) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4175;Cerura erminea (Esper, 1783) ;Liste Levesque; ;

LYMANTRIIDAE

4180;Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4186;Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4187;Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4188;Euproctis similis (Fuessly, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4189;Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4190;Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4191;Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4193;Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;

ARCTIIDAE

4196;Setina irrorella (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4198;Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4201;Paidia rica (Freyer, 1858) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4203;Miltchrista miniata (Forster, 1771) ;Liste Levesque; ;
4205;Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4206;Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4208;Wittia sororcula (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque; ;
4210;Eilema griseola (Hübner, 1803) ;Liste Levesque; ;
4211;Eilema caniola (Hübner, [1808]) ;Liste Levesque; ;
4217;Eilema complana (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4218;Eilema lurideola (Zincken, 1817) ;Liste Levesque; ;
4219;Eilema depressa (Esper, 1787) ;Liste Levesque; ;
4220;Apaidia mesogona (Godart, [1824]) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4222;Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) ; ; ;
4224;Spiris striata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4228a;Hyphoraia testudinaria (Fourcroy, 1785) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4230;Arctia caja (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4233;Epicallia villica (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4241;Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4243;Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4245;Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4246;Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4248;Diaphora mendica (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4250;Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4254;Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) ; ; ;
4255;Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4256;Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;

NOCTUIDAE

4265;Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) ; ; ;
4268;Zanclognatha tarsipennalis Treitschke, 1835 ; ; ;
4269;Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) ; ; ;
4270;Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4274;Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) ; ; ;
4275;Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;
4278;Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) ; ; ;

4279;Rivula sericealis (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;	;
4281;Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4283;Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4284;Schrankia taenialis (Hübner, 1809)	;	;
4285;Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)	;	;
4289;Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4290;Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4293;Hypena obsitalis (Hübner, 1813)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4295;Phytometra viridaria (Clerck, 1759)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4297;Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
4299;Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4309;Lygephila cracca (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
4310;Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
4314;Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4316;Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4317;Callistege mi (Clerck, 1759)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4320;Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)	;Liste Levesque;	;
4323;Anua lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4328;Catocala nupta (Linnaeus, 1767)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4329;Catocala elocata (Esper, 1787)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4330;Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4339;Catocala fulminea (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;	;
4343;Acontia lucida (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4345;Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4346;Deltote bankiana (Fabricius, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4350;Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;
4351;Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;	;
4366;Eublema purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4370;Rhypagla lacernaria (Hübner, 1813)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;	;
4382;Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)	;	;
4383;Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)	;	;
4384;Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;
4390;Bena bicolorana (Fuessly, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4390;Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4393;Earias clorana (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4398;Nycteola revayana (Scopoli, 1772)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4400;Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4417;Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4421;Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)	;Liste Levesque;	;
4426;Autographa gamma (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4433;Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4437;Cryphia muralis (Forster, 1771)	;Liste Levesque;	;
4438;Cryphia domestica (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4441;Cryphia raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4443;Cryphia ravula (Hübner, 1813)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4446;Cryphia algae (Fabricius, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4450;Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
4451;Viminia rumicis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4453;Viminia auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4456;Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4457;Arctomyziscis aceris (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4459;Triaena psi (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4460;Triaena tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4461;Triaena cuspidata (Hübner, 1813)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4463;Moma alpium (Osbeck, 1778)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4470;Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4471;Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4472;Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4473;Xanthia togata (Esper, 1788)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4474;Xanthia sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4475;Xanthia aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
4477;Atethmia centrago (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;	;
4479;Omphaloscelis lunosa (Haworth, 1809)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4480;Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4485;Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4486;Agrochola pistacinoides (d'Aubuisson, 1867)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4489;Agrochola macilentata (Hübner, [1809])	;Liste Levesque;	;
4490;Agrochola lota (Clerck, 1759)	;Liste Levesque;	;
4491;Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;	;
4492;Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
4493;Conistra staudingeri (Graslin, 1863)	;	;
4494;Conistra rubiginosa (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4499;Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4501;Conistra ligula (Esper, 1791)	;Liste Levesque;	;
4502;Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;	;
4503;Jodia croceago (Denis & Schiffermüller, 1775)	;	;
4504;Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)	;	;
4505;Eumichtis lichenea (Hübner, 1813)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4516;Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;	;
4521;Trigonophora flammea (Esper, [1785])	;Liste Levesque;	;
4525;Mniotype adusta (Esper, 1790)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;	;
4526;Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;	;
4530;Dryobotodes roboris (Boisduval, [1828])	;	;
4531;Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)	;Liste Levesque;	;
4534;Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4535;Valeria jaspidea (Villers, 1789)	;Liste Levesque;	;
4538;Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;	;
4541;Xylocampa areola (Esper, 1789)	;Liste Levesque;	;

4542;Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4543;Xylena vetusta (Hübner, 1813) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4546;Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4549;Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque; ;
4551;Lithophane semibrunea (Haworth, 1809) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4555;Aporophyla nigra (Haworth, 1809) ; ; ;
4556;Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4557;Aporophyla australis (Boisduval, 1829) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4557a;Aporophyla canescens (Duponchel, 1826) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4559;Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4563;Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4568;Brachionycha sphinx (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4570;Leucochlaena oditis (Hübner, 1822) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4571;Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4572;Episema scoriacea (Esper, 1789) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4593;Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4595;Calophasia platyptera (Esper, 1788) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4598;Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4599;Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4601;Shargacucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4614;Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4624;Elaphria venustula (Hübner, 1790) ;Liste Levesque; ;
4633;Proxenus hospes (Freyer, 1831) ; ; ;
4635;Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4638;Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4639;Paradrina noctivaga (Bellier, 1863) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
4642;Paradrina selini (Boisduval, 1840) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4646;Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
4652;Spodoptera exigua (Hübner, [1808]) ;Liste Levesque; ;
4655;Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4656;Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4658;Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4659;Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4660;Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) ; ; ;
4661;Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque; ;
4663;Sesamia nonagrioides (Lefebvre, 1827) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4666;Oria muscolosa (Hübner, 1808) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4682;Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4685;Hydraecia micacea (Esper, 1789) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4693;Luperina dumerilii (Duponchel, 1827) ;Liste Levesque; ;
4695;Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4696;Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4698;Chortodes pygmina (Haworth, 1809) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4705;Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4706;Mesapamea didyma (Esper, 1788) ; ; ;
4708;Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4711;Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;
4711;Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) ; ; ;
4712;Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) ; ; ;
4713;Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4715;Apamea ophiogramma (Esper, [1794]) ; ; ;
4716;Apamea scolopacina (Esper, [1788]) ; ; ;
4717;Apamea sordens (Hufnagel, 1766) ; ; ;
4721;Apamea unanimes (Hübner, 1813) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;Douteux;
4731;Apamea epomidion (Haworth, 1809) ; ; ;
4733;Apamea sublustris (Esper, 1788) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4735;Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4736;Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque; ;
4739;Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4740;Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4741;Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4742;Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) ;Liste Levesque; ;
4743;Dicycla oo (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4756;Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4758;Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4762;Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4764;Polyphaenis sericata (Esper, 1787) ;Liste Levesque; ;
4766;Rusina ferruginea (Esper, 1785) ;Liste Levesque; ;
4767;Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4768;Mormo maura (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4781a;Sablia sicula (Treitschke, 1835) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4783;Pseudaletia unipuncta (Haworth, 1809) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4784;Aletia l-album (Linnaeus, 1767) ;Liste Levesque; ;
4787;Aletia pallens (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4789;Aletia straminea (Treitschke, 1825) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4790;Aletia pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) ; ; ;
4791;Aletia vitellina (Hübner, 1808) ;Liste Levesque; ;
4792;Aletia albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4793;Aletia ferrago (Fabricius, 1787) ;Liste Levesque; ;
4798;Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4799;Orthosia munda (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4800;Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) ;Liste Levesque; ;
4801;Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) ;Liste Levesque; ;
4802;Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4805;Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4806;Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) ;Liste Levesque; ;
4807;Egira conspiciellaris (Linnaeus, 1758) ;Liste Levesque; ;
4809;Tholera decimalis (Poda, 1761) ;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;

4821;Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4825;Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4826;Hadena luteago (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4831;Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4832;Hadena rivularis (Fabricius, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4835;Aetheria dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4836;Aetheria bicolorata (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4837;Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque; ;
4842;Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque; ;
4844;Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4846;Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque; ;
4859;Hada plebeja (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque; ;
4864;Dicestra trifolii (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque; ;
4869;Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4871;Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque; ;
4872;Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1175)	;Liste Levesque; ;
4875;Naenia typica (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4876;Xestia agathina (Duponchel, 1827)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4878;Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque; ;
4882;Xestia castanea (Esper, 1798)	; ; ;
4883;Xestia rhomboidea (Esper, 1790)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4888;Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque; ;
4894;Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4895;Diarsia rubi (Vieweg, 1790)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4896;Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4899;Diarsia mendica (Fabricius, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4900;Peridroma saucia (Hübner, 1808)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4901;Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4915;Noctua interjecta (Hübner, 1803)	;Liste Levesque; ;
4916;Noctua janthe (Borkhausen, 1792)	; ; ;
4917;Noctua janthina (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque; ;
4918;Noctua comes (Hübner, 1813)	;Liste Levesque; ;
4920;Noctua orbona (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4921;Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque; ;
4923;Noctua fimbriata (Schreber, 1759)	;Liste Levesque; ;
4947a;Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)	; ; ;
4951;Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque; ;
4963;Axylia putris (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4969;Agrotis crassa (Hübner, 1803)	;Liste Levesque; ;
4972;Agrotis puta (Hübner, 1803)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4973;Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque; ;
4974;Agrotis trux (Hübner, 1824)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4975;Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)	;Liste Levesque; ;
4976;Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4977;Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque; ;
4992;Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
4998;Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
5000;Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
5009;Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)	;Liste Levesque;Non retrouvé à ce jour;
5013;Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)	;Liste Levesque; ;

Annexe 2 : Liste des Lépidoptères hétérocères observés sur la RBI de Chizé depuis 1937 (par ordre alphabétique)

Annexe 3 : fiche descriptive de 2 des Hétérocères patrimoniaux
(extraits des sites www.lepinet.fr, www.papillons-poitou-charentes.fr et
www.6pattes.fr)

Lasiocampidae Lasiocampinae

Eriogaster catax L.



Le Bombyx Evérie, La Laineuse du Prunellier



Nourriture de la chenille : Prunelliers, Aubépines surtout

[Www.](#)

Références : Liste Leraut 1997 : n°3208 / Liste Leraut 1980 : n°3150

Envergure : 32 à 46 mm

Période de vol : Septembre-Octobre



Photo Daniel Morel.



Chenille . Photo David Demerges

Endromidae

Endromis versicolora L.



Le Versicolore



Nourriture de la chenille : Bouleau et parfois Aulne

Références : Liste Leraut 1997 : n°3229 / Liste Leraut 1980 : n°3142

Envergure : 55 à 62 mm

Période de vol : Fin mars à mi-mai

Informations régionales :

Etat des connaissances en 1912 - Gelin Henri et Lucas Daniel - Catalogue des Lépidoptères observés dans l'ouest de la France) : *L'imago est visible de mars à avril. Parfois en octobre. Les femelles se tiennent le plus souvent posées sur l'extrémité des branches de bouleaux, les mâles les cherchent en volant, tard dans l'après-midi (Spuler). Chenille sur betula, puis sur alnus, salix, carpinus, corylus ; "polyphage sur les arbres" Frionnet. Elle est visible en juillet.*

Etat des connaissances en 1983 - Levesque Robert - Supplément au Catalogue des Lépidoptères de l'ouest Atlantique : *Signalé par Houmeau en 1972, qui en avait pris 4 exemplaires le 31 mars en forêt de Chizé. Pris ensuite tous les ans en forêt de Chizé, de l'Hermitain, Autun. Il n'y a pas de bouleau en forêt de Chizé. La ponte semble s'effectuer sur le hêtre.*

Situation actuelle - 2011 (Guyonnet Antoine) : *Espèce qui n'a plus été revue en forêt de Chizé depuis les années 2000. Rare et localisée.*



Mâle, Lembach (Bas-Rhin), 17 mars 2007.

Photo François Spill.